



# ADAMA

## Produktkatalog

Ihre Auswahl vom 10.06.2026



# ADDITION®

Zulassungsnummer: 006840-00

## Produktbeschreibung

<b>Info:</b>	Nachauflauf-Herbizid zur Bekämpfung von Windhalm, einjährigem Rispengras und zweikeimblättrigen Unkräutern im Herbst
<b>Kulturen:</b>	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale, Gräser zur Saatguterzeugung (ausgenommen: Wiesen-Rispengras)
<b>Produkttyp:</b>	Herbizid
<b>Wirkstoffe:</b>	400 g/l Pendimethalin (37 Gew.-%) 40 g/l Diflufenican (3,6 Gew.-%)
<b>Formulierung:</b>	Suspensionskonzentrat
<b>GefahrstoffEinstufung:</b>	GHS09 Umweltgefährlich GHS08 Gesundheitsgefährdend

## Abpackung

<b>4 x 5l Umkarton</b>	Art.Nr. 7490191
<b>UFI-Code</b>	RD94-W13V-600J-TQPP



## Wirkungsweise

ADDITION® ist ein Nachauflauf-Herbizid zur Bekämpfung von Windhalm, einjährigem Rispengras und zweikeimblättrigen Unkräutern in Wintergerste, Winterweichweizen, Winterroggen und Wintertriticale im Herbst.

ADDITION® enthält zwei Wirkstoffe, die unterschiedliche Wirkungsmechanismen besitzen. Beide Wirkstoffe wirken sowohl über den Boden als auch über das Blatt. Die Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, den Keimling sowie den Keim- und Laubblättern der Unkäter und Ungräser. ADDITION wird im frühen Nachauflauf bis zum 3-Blatt-Stadium eingesetzt. Auf eine ausreichende Bodenfeuchtigkeit ist zu achten.

Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode):

(früher HRAC Gruppe: F1)

Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode):

Pendimethalin: 3

Diflufenican: 12

---

## Wirkungsspektrum

### gut bekämpfbar

Einjähriges Rispengras, Gemeiner Windhalm, Acker-Hellerkraut, Acker-Stiefmütterchen, Ausfallraps, Ehrenpreis-Arten, Gänseldistel, Hirtentäschel, Kletten-Labkraut, Kreuzkraut, Klatschmohn, Storchschnabel-Arten, Taubnessel-Arten, Vogelsternmiere

### weniger gut bekämpfbar

Kamille-Arten

### nicht ausreichend bekämpfbar

Acker-Fuchsschwanz, Flughafer, Gemeine Quecke, Wurzelunkräuter

### WEITERE HINWEISE

ADDITION enthält die Wirkstoffe Diflufenican und Pendimethalin. Sollten nach Anwendung des Mittels nicht erklärbare Wirkungsminderungen auftreten, ist Resistenz nicht grundsätzlich auszuschließen. In diesen Fällen dürfen ADDITION oder andere Mittel, die diese Wirkstoffe enthalten, nicht bzw. nicht erneut eingesetzt werden. Alternativ können Mittel mit anderen Wirkungsmechanismen zur Anwendung kommen, sofern gegen diese keine Resistenzen vorliegen. Im Zweifelsfall die Pflanzenschutzberatung konsultieren und bei der Mittelwahl potentielle Mehrfach- und Kreuzresistenz berücksichtigen.

## Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen

Pflanzen/Objekte	Schadorganismus/Zweckbestimmung
<b>Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale</b>	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

**(NW468)** Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

**(NT145)** Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungskategorie 90 % eingetragen ist. Abweichend von den

Vorgaben im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" sind die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten.

(NT146) Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten.

(NT170) Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten.

## Anwendung

Ackerbau

<b>Pflanzenerzeugnisse</b>	Winterweichweizen, Wintergerste, Winterroggen, Wintertriticale
<b>Schadorganismus/Zweckbestimmung</b>	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
<b>Anwendungsbereich</b>	Freiland
<b>Stadium der Kultur</b>	1. Laubblatt aus der Koleoptile ausgetreten bis 3-Blatt-Stadium: 3. Laubblatt entfaltet (BBCH-Code: 10 - 13)
<b>Anwendungszeitpunkt</b>	Nach dem Auflaufen, Herbst
<b>Max. Zahl der Behandlungen</b>	In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1
<b>Anwendungstechnik</b>	Spritzen
<b>Aufwandmenge</b>	2,5 l/ha
<b>Wasseraufwandmenge</b>	300 bis 400 l/ha
<b>Wartezeit</b>	Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich (F).

**NW607-1 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "\*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.**

**NW706 Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist**

nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

NW800 Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.

WP734 Schäden an der Kulturpflanze möglich.

#### Ackerbau

<b>Pflanzenerzeugnisse</b>	Gräser (ausgenommen: Wiesen-Rispengras)
<b>Schadorganismus/Zweckbestimmung</b>	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
<b>Anwendungsbereich</b>	Freiland
<b>Stadium der Kultur</b>	Von 2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis 10 % des arttypischen max. Längen- bzw. Rosettenwachstums erreicht; 1-Knoten-Stadium
<b>Anwendungszeitpunkt</b>	Nach dem Auflaufen, Herbst
<b>Max. Zahl der Behandlungen</b>	In der Anwendung: 1 In der Kultur bzw. je Jahr: 1
<b>Anwendungstechnik</b>	spritzen
<b>Aufwandmenge</b>	2,5 l/ha
<b>Wasseraufwandmenge</b>	200 bis 400 l/ha
<b>Wartezeit</b>	Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.

#### Hinweis für genehmigte Anwendungen

In Abhängigkeit von Kultur, Sorte, Anbauverfahren und spezifischen Umweltbedingungen können Schäden an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Die Pflanzenverträglichkeit sollte daher unter den betriebsspezifischen Bedingungen geprüft werden.

## GENEHMIGUNGEN NACH § 18 A PFLSCHG (1998) BZW. ERWEITERTE ZULASSUNGEN GEM. ART. 51 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1107 / 2009

PFLANZEN/OBJEKTE	SCHADORGANISMUS/ZWECKBESTIMMUNG
<b>Gräser (ausgenommen: Wiesen-Rispengras)</b>	Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

#### Mischbarkeit

ADDITION ist mit gebräuchlichen Herbiziden und Insektiziden mischbar. Bei Ausbringung von Tankmischungen ist unbedingt die Gebrauchsanleitung des Mischpartners zu beachten. Für eventuelle negative Auswirkungen von Mischungen, die von uns nicht empfohlen werden, haften wir nicht.

---

## Pflanzenverträglichkeit

ADDITION ist nach bisheriger Kenntnis in allen zugelassenen Getreidearten gut verträglich. Eine besondere Empfindlichkeit einzelner Sorten konnte nach unseren bisherigen Erfahrungen in den o. g. Wintergetreidearten nicht festgestellt werden. Voraussetzung für eine gute Kulturverträglichkeit ist ein abgesetztes Saatbett, eine gleichmäßige Saattiefe von 2-3 cm und eine ausreichende Erdbedeckung des Saatgutes.

Wenn möglich nur abgetrocknete Pflanzenbestände behandeln, darüber hinaus ist ein feinkrümeliges Saatbeet mit einem guten Bodenschluss von Vorteil. Die Anwendung von ADDITION wird nicht empfohlen bei Frost bzw. in frostgeschädigten Beständen, bei extremer Trockenheit, bei Staunässe und in Beständen, die unter Nährstoffmangel oder Stress leiden.

---

## Anwendungstechnik

### Ansetzen der Spritzbrühe

Tank zu  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{3}{4}$  mit Wasser füllen, ADDITION gut schütteln und in den Tank geben. Tank mit Wasser auffüllen und Rührwerk betätigen, um das Produkt in der Spritzbrühe gleichmäßig zu verteilen. Spritzgerät regelmäßig auf Prüfstand testen. Vor der Behandlung Gerät auslitern und Düsenausstoß kontrollieren. Während der Fahrt und während des Spritzens Spritzbrühe durch Rührwerk oder Rücklauf in Bewegung halten. Nach Arbeitspausen Spritzbrühe erneut aufrühren. Überdosierungen sind zu vermeiden. Abdrift auf Nachbarkulturen vermeiden. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als notwendig. Behälter restlos entleeren, mit Wasser ausspülen, Spülwasser der Spritzbrühe beigeben. Unvermeidliche anfallende Spritzflüssigkeitsreste im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf der behandelten Fläche ausbringen.

### Ausbringungstechnik

Durch eine fach- und sachgerechte Anwendung der Pendimethalin-haltigen Produkte können Pendimethalin-Rückstände in angrenzenden Kulturen vermieden oder minimiert werden. Drift sollte durch den Anwender absolut vermieden werden. Zudem sollte die Anwendung von Pendimethalin-haltigen Produkten unter ungünstigen thermischen Bedingungen (z.B. an sehr heißen Tagen) vermieden werden.

Generelle Empfehlungen zur Minimierung der Abdrift und des Verflüchtigungsrisikos von Pendimethalin:

Applikationstechnik:

- Spritztechnik (Düsen, Druck, Wasseraufwand, Fahrgeschwindigkeit) mit einer Abdriftreduzierung von größer-gleich 90 % auf der gesamten Behandlungsfläche einsetzen.
- Gestängeabstand von 50 cm zur Behandlungsfläche nicht überschreiten.

Umweltbedingungen:

- Behandlung bei möglichst niedrigen Temperaturen (kleiner-gleich 20 °C); Applikation in den späten Nachmittag- und Abendstunden bevorzugen.
- Anwendung nur bei geringer Windgeschwindigkeit (kleiner-gleich 3 m/s).
- Einsatz bei Windrichtung zur gefährdeten Nachbarkultur verschieben.
- Keine Behandlung bei einem Risiko von Winderosion/Staubverfrachtung.

Risikomanagement:

- Abstimmung von Sicherheitsmaßnahmen in der Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (Gemüse, Heil- und Gewürzkräuter, u.a. Sonderkulturen), um Belastung durch Verflüchtigung und Abdrift zu verhindern.

### Reinigung

Spritzgerät und -leitungen vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Anfallendes Spülwasser auf vorher behandelten Flächen ausspritzen. Waschwasser aus der Gerätereinigung nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

---

## Nachbau

Bei normaler Fruchtfolge bestehen keine Nachbaueinschränkungen. Vor Zuckerrüben wird im Herbst eine tiefe Bodenbearbeitung (Pflugfurche) empfohlen. Bei vorzeitigem Umbruch der Kultur durch Auswinterung können im Frühjahr nach tiefer Bodenbearbeitung (Pflug) alle landwirtschaftlichen Kulturen nachgebaut werden. Bei nur flacher Bodenbearbeitung (Minimalbodenbearbeitung) ist der Nachbau von Sommergerste, Sommerweizen, Sommerraps, Kartoffeln, Ackerbohnen und Erbsen möglich. Bei einem Umbruch des behandelten Getreides im Herbst kann Getreide nachgebaut werden, wobei für die Spätsaat nur Winterweizen in Frage kommt.

---

## Umweltverhalten

Nutzorganismen	
<b>NB6641</b>	Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
<b>NN3002</b>	Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.
<b>NN1001</b>	Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.

Wasserorganismen	
<b>NW264</b>	Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.
<b>NW265</b>	Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
<b>NW262</b>	Das Mittel ist giftig für Algen.

---

## Anwenderschutz

<b>(SB001)</b>	Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
<b>(SB110)</b>	Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
<b>(SE110)</b>	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

(SS110)	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SS610)	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SS2101)	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SF245-01)	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

## Gefahreneinstufung



Achtung

## Erste Hilfe

Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Mit viel Wasser mehrere Minuten gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen.

Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung. 24-Stunden-Notrufnummer GGIZ: 0361 730730.



Aktuelle Sicherheitsdatenblätter  
für alle ADAMA Produkte finden Sie online unter  
**[www.adama-produkte.com](http://www.adama-produkte.com)**

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.  
© reg. WZ der ADAMA Unternehmensgruppe

© ADAMA Deutschland GmbH, 2026

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln  
Telefon +49 2203 5039-000 | Telefax +49 2203 5039-199  
[info@de.adama.com](mailto:info@de.adama.com) | [adama.com](http://adama.com)